



به نام او که هم درد است و هم درمان

دکولمان جفت



شماره تلفن تماس : ۰۳۴۳۳۲۱۹۹۱

شماره دورنگار : ۰۳۴۳۳۲۱۲۱۴۵

آدرس: میدان خواجو، بلوار ۲۲ بهمن چهارراه اول

کدسند: NO-BR-15

تهیه و تدوین: هما یکتاپور - واحد آموزش


دکولمان جفت (جداشدگی جفت قبل از زایمان)

دکولمان چیست؟

جدا شدن جفت قبل از زایمان، عبارت است از جداشدگی جفت از دیواره ی رحم به طور ناقص در سه ماه آخر حاملگی.

اگر جفت زودتر از موعد به طور ناقص از دیواره ی رحم جدا شود، زندگی جنین به خطر می افتد.

درمان آن به شدت جداشدگی، وضعیت جنین و مدت زمانی که از بارداری گذشته است بستگی دارد.



علامین شایع دکولمان:

۱- جداشدگی جفت با مقدار کم خونریزی: درد مختصر یا تنها احساس ناراحتی.

۲- جداشدگی جفت با مقدار شدید خونریزی: درد شدید در پایین شکم یا پایین کمر-سفت شدن شکم و احساس درد در شکم به هنگام لمس شکم.

۳- شوک: در این حالت قلب تندتر میزند، نفس تندتر می شود و به بیمار حالت منگی یا گیجی دست می دهد.

۴- زجر جنین: به طور کلی ضربان قلب جنین قابل شنیدن نباشد.

۵- انعقاد خون در داخل رگ های بدن: به هنگام جداشدن جفت برخی مواد از آن به خون مادر وارد می شود و باعث انعقاد گسترده خون در داخل رگهای مادر می شود. (به علت مصرف بیش از حد مواد انعقادی در داخل رگهای بدن مادر و ناکافی بودن آنها برای بند آوردن خونریزی امکان دارد خونریزی هایی در نقاط مختلف بدن دیده شوند، مثلا خونریزی از بینی، خونریزی در ادرار، خونریزی در نواحی زخم شده، خونریزی به داخل پوست، پدید آوردن نقاط گرد و قرمز رنگ در پوست.)

علل دکولمان:

هنوز علت مشخصی پیدا نشده است.

عوامل افزایش دهنده خطر

۱- زیاد بودن فشار خون

۲- سیگار کشیدن

۳- سن بیشتر از ۳۵ سال

۴- زیاد بودن تعداد بارداریهای قبلی

۵- سابقه دکولمان در بارداریهای قبلی

۶- وارد شدن ضربه مستقیم به رحم

۷- وجود یک بیماری مزمن مثل دیابت (مرض قند)

۸- مصرف الکل یا مواد مخدر به ویژه کوکائین

۹- استفاده از دماسنج مقعدی یا وسیله مخصوص تنقیه

پیشگیری:

۱- اگر باردار هستید فعالیت هایی انجام دهید که پیش از بارداری انجام میدادید و به آن عادت داشتید. فعالیت شما نباید شدیدتر از آن حد باشد.

۲- تا حد امکان از عوامل خطر اجتناب ورزید.

۳- البته با توجه به اینکه علت دقیق این وضعیت هنوز معلوم نشده است، هیچ راه تضمین شده ای برای پیشگیری از آن وجود ندارد.

جدا شدن زودرس جفت



عواقب مورد

- اگر جداشدگی جفت زیاد شدید نباشد، با انجام اقدامات فوری، پیش آگهی مادر و جنین خوب است.

۱۰ تا ۱۷ درصد از مادرانی که دچار جداشدگی جفت قبل از زایمان می شوند، در یکی از بارداریهای آینده نیز دچار این وضعیت خواهند شد. بنابراین پزشک خود را از وقوع این عارضه در بارداری قبل آگاه کنید.

درمان:

جداشدگی جفت قبل از زایمان یک اورژانس است، اما معمولاً زمان برای اخذ توصیه های لازم با تلفن و ترتیب دادن انتقال بدون خطر به بیمارستان به حد کافی وجود دارد.

اگر جدا شدگی جفت خفیف باشد، امکان دارد که بتوانید پس از معاینه به خانه باز گردید و در تخت استراحت نموده و تحت مراقبت دقیق قرار بگیرید.

به غیر از موارد خفیف، بستری در بیمارستان ضروری است. و ممکن است برای نجات جان نوزاد جراحی به روش سزارین یا گاهی اوقات زایمان طبیعی انجام گیرد.

منبع: بیماریهای زنان و زایمان ویلیامز