

انواع پنومونی

انواع بیماری بر اساس محل و نحوه اکتساب
عبارتنداز:

پنومونی اکتسابی در بیمارستان

این نوع پنومونی باکتریایی در هنگام بستری شدن در

بیمارستان به وجود می آید و حادتر از سایر انواع پنومونی است زیرا باکتری عامل ایجاد آن نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم است.

پنومونی اکتسابی از جامعه

منظور از پنومونی اکتسابی از جامعه یک نوع از باکتری است که در خارج از محیط بیمارستان به وجود می آید.

پنومونی اکتسابی از دستگاه تهویه

در مواردی که بیمار به علت استفاده از دستگاه تهویه دچار پنومونی می شود به این وضعیت پنومونی اکتسابی از دستگاه تهویه می گویند.

پنومونی تنفسی

این اختلال زمانی به وجود می آید که باکتری از طریق غذا، مایعات یا بزاق وارد ریه شود اختلال بلع از مواردی است که مسبب این بیماری است.
علل

انواع مختلفی از میکرووارگانیسم ها در بروز این

پنومونی چیست؟

پنومونی عبارتست از التهاب حاد ریه ها ناشی از عفونت بافت ریه.

علائم


علائم پنومونی به صورت خفیف تا شدید خود را نشان می دهد که برخی از آنها به شرح زیر است:

سرfe که با تولید خلط همراه است.

تب عرق کردن یا لرزتنگی نفس که در هنگام انجام فعالیت های روزمره یا استراحت کردن به وجود می آید.

احساس خستگی از دست دادن اشتها

تهوع یا استفراغ سردد




بنام اوکه هم در است و هم درمان

بیمارستان نیمه شعبان

بخش داخلی

موضوع: پنومونی



ادرس: کرمان - بلوار ۲۲ بهمن

چهارراه شعبانیه

تلفن: ۳۳۳۲۱۹۸۸-۹۸

پنومونی باکتریایی

شایع ترین عامل به وجود آورنده پنومونی باکتریایی، باکتری استرپتوکوکوس است.

سایر علل آن به شرح زیر است:

■ مایکوپالسما پنومونیه

■ هموفیلوس آنفولانزا،

■ لژیونا پنوفیلوما

پنومونی ویروسی

در برخی موارد ویروس های تنفسی باعث بروز پنومونی خواهند شد که برخی از آنها عبارتند از:

آنفولانزا

■ ویروس سرما خوردگی

■ ویروس سین سیتیال تنفسی

پنومونی ویروسی معمولاً به صورت خفیف تر به وجود می آید و طی مدت یک تا سه هفته بدون درمان بهبود پیدا می کند.

پنومونی قارچی

این نوع پنومونی اغلب در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی

دارند به وجود می آید. برخی از انواع قارچ هایی که در بروز

این پنومونی نقش دارند عبارتند از:

- پنوموسیتیس جیروسی، گونه های هیستوپالزموس

فاکتورهای خطرزا

احتمال ابتلا به این بیماری در همه افراد وجود دارد اما ریسک بروز آن در برخی بیشتر از سایرین است این گروه های خطر عبارتند از:

۱. نوزادان از زمان تولد تا سن دو سالگی و افراد بالای ۶۵ سال.

۲. افرادی که به علت بیماری یا استفاده از داروهایی دچار ضعف سیستم ایمنی هستند. مانند استروئیدها یا داروهای مخصوص سرطان

۳. افراد مبتلا به برخی از بیماری های مزمن از قبیل آسم، دیابت، نارسایی قلبی یا فیبروز سیستیک.

۴. افراد مبتلا به عفونت های تنفسی از قبیل سرماخوردگی یا آنفولانزا.

اصول خود مراقبتی در بیماران

- استفاده از بخور گرم
- تنفس عمیق ۲ تا ۳ بار هر ساعت
- سیگار کشیدن، مصرف الکل، تزریق مواد مخدر
- خطر ابتلا به پنومونی را افزایش می دهد.
- تهویه مناسب محل کار و زندگی
- داشتن تغذیه سالم
- استفاده از استامینوفن و پروفن جهت تخفیف درد با تجویز پزشک.
- استفاده از ضدسرفه به علت کاهش خروج ترشحات توصیه نمی شود.
- توصیه به مصرف مایعات گرم مثل آبجوش عسل و لیمو.
- تکمیل دوره آنتی بیوتیک درمانی
- استفاده از مایعات فراوان و استراحت کافی

منبع : برونر و سوردادث ۲۰۱۸