

رینوپلاستی

جراحی زیبایی بینی که با تغییر استخوان یا غضروف انجام می شود رینوپلاستی گفته میشود که از رایج ترین انواع جراحی پلاستیک است .

خطرات و عوارض

عفونت

خونریزی

واکنش به بیهوشی

مشکلات تنفسی بینی

بینی نامتقارن

مراقبت بعد از عمل

- ۱- تا ۶ ساعت پس از عمل چیزی میل نشود تا باعث تهوع و استفراغ نگردد
- ۲- دو هفته قبل از عمل نباید از داروهای ضد انعقاد و آسپرین استفاده شود.



بیمارستان نیمه شعبان

بخش جراحی

رینوپلاستی



ادرس : کرمان – بلوار ۲۲ بهمن

چهارراه شعبانیه

تلفن: ۹۸-۳۳۳۲۱۹۸۸

شماره دورنگار : ۰۳۴۳۳۳۱۲۱۴۵

تهیه و تدوین : زهرا ظهیری

۳- در حین استراحت زیر سر بالا باشد و فقط در حد معمول دراز بکشید تا بینی متورم نشود

۴- حداقل تا یک هفته بعد از عمل جهت جلوگیری از خیس شدن آتل بینی باید مراقب باشید لذا برای حمام کردن به وسیله دوش دستی از گردن به پایین را بشویید و بعد موها را جداگانه بشویید تا پانسمان خیس نشود

۵- بعد از عمل بینی گاز کوچکی گذاشته می شود تا خونی که خارج می شود جذب شود در صورت کثیف شدن تعویض شود

۶- تا وقتی که آتل بینی برداشته نشده است از لباسهایی که جلو زیب یا دکمه دارند استفاده شود

۷- ۴۸-۷۲ باید بعد از عمل از کمپرس سرد بطور متناوب(ترجیحا کمپرس عینکی)در گونه ها و اطراف بینی استفاده شود تا ورم و کبودی کاهش پیدا کند

۸- حداقل تا سه ماه بعد از عمل جهت جلوگیری از ضربه به بینی از ورزش و فعالیت شدید جلوگیری کنید

۹- به مدت یک هفته پس از عمل مصرف آنتی بیوتیک و مسکن خوراکی که پزشک تجویز می کند ضرورت دارد


انواع رینوپلاستی

جراحی بینی باز: در این نوع عمل جراحی پزشک به تمامی


بخشهای بینی دسترسی داشته و میتواند با آزادی بیشتری تغییرات مورد نظر را اعمال کند از این روش میتوان برای رفع مشکل و زیبا کردن بینی در مدل های مختلف بینی گوشتی دارای قوز و یا انحراف استفاده کرد

جراحی بینی بسته : در این روش تنها یک برش ریز در

قسمت پایینی بینی زده شده و یا تمام عمل از طریق حفره های بینی انجام میشود و کمترین مقدار تورم ، درد و تمام مشکلات بعد از عمل را تجربه خواهید کرد این روش برای افرادی که دوست ندارند جای بخیه حتی برای زمان کوتاهی بر روی صورت آنها بماند مناسب است



جراحی بینی به روش باز



جراحی بینی به روش بسته

علائم هشدار

اگر تورم و کبودی بینی یا قرمزی در برش جراحی بینی در حال افزایش باشد

اگر درد شدید یا افزایش یابنده در بینی داشته باشید که به دارو پاسخ ندهد

اگر دچار واکنش دارویی یا عدم تحمل آنها شده باشید

اگر تب بالای ۳۸ درجه دارید

اگر خونریزی از بینی یا ناحیه ی بخیه ها داشتید که کاهش نیافت

اگر احساس ضعف و بی حالی شدید می کنید

اگر احساس تنگی نفس-درد قفسه سینه یا ضربان قلبی غیر طبیعی داشتید تمام این موارد اگر برای شما رخ داد سریعاً به پزشک یا اورژانس مراجعه نمایید

۱۰- اگر پوست بینی شما ضخیم است تورم دیرتر از بین می رود و ممکن است ۶ تا ۱۲ هفته توصیه به چسب زدن شود و قبل از هر بار تعویض چسب بهتر است دوش گرفته شود

۱۱- در ۲ تا ۳ ماه اول بعد از عمل تورم ناشی از عمل شدیدتر است و به مرور بینی شکل بهتری پیدا می کند

۱۲- یک هفته بعد از عمل برای برداشتن آتل بینی به مطب مراجعه نمایید و تا ۳ هفته پس از آن جهت تعویض چسب بینی هفته ای یکبار مراجعه نمایید

۱۲- 48 ساعت بعد از عمل جهت برداشتن مش بینی به مطب مراجعه شود

۱۳- شکل نهایی بینی باگذشت ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد از عمل مشخص می گردد

